

# Notfall-Einweisung

von Praxis \_\_\_\_\_

Patient\*innendaten / Etikette \_\_\_\_\_

(Bei Kindern auch Vorname der Eltern) \_\_\_\_\_

Nebendiagnose \_\_\_\_\_

## Medikation

(Bitte Zutreffendes ankreuzen, bei „Andere“ bitte Dosierung und Intervall hinzufügen)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alles nach Schema                         | <input type="checkbox"/> Co-Amoxi 2,2g i.v 3x tgl.                   |
| <input type="checkbox"/> Prednisolon 100 mg Tbl. : 1-0-0:          | <input type="checkbox"/> Kefzol 2g i.v 2 x tgl.                      |
| <input type="checkbox"/> Praxiliene 200 mg Kps. 2-2-2 bis Austritt | <input type="checkbox"/> Tazobactam 4,5g i.v 3x tgl.                 |
| <input type="checkbox"/> Valium 5 mg Tbl. 0-0-0-1                  | <input type="checkbox"/> Andere (Dosierung und Intervall hinzufügen) |
| <input type="checkbox"/> Co-Amoxi 1,2g i.v 3x tgl.                 | _____  |

## Infusion

- Alles nach Schema
- 500 ml Voluven 6% 2x tgl.
- 1000ml Ringerlactat über \_\_\_\_\_
- 1000ml NaCl0.9% über \_\_\_\_\_
- Andere: \_\_\_\_\_

## Reservemedikation

- Perfalgan 1g i.v 4x tgl.
- Dafalgan 1g Tbl. 1-1-1-1
- Mefenacid 500 mg Tbl. 1-1-1
- Andere: \_\_\_\_\_

## Ernährung

- Pat. muss nüchtern bleiben, bis \_\_\_\_\_
- Pat. darf nichts essen, nur trinken bis \_\_\_\_\_
- Normale Kost ab sofort \_\_\_\_\_

## Allgemeine Untersuchungen

- MRI am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_
- Andere: \_\_\_\_\_

Blutkontrolle am \_\_\_\_\_

Hb  CRP  Quick

Andere \_\_\_\_\_

Ort / Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift und Stempel Praxis \_\_\_\_\_